



Échelle de Maddox

Surveillance de la voie veineuse périphérique

INDICE	SIGNES CLINIQUES	
0	Pas de signes	
1	Site de ponction sensible <i>OU</i> rougeur	
2	Sensibilité du site de ponction avec rougeur <i>OU</i> léger œdème	
3	Sensibilité du site de ponction avec rougeur et léger œdème <i>OU</i> cordon veineux palpable	
4	Sensibilité du site de ponction avec rougeur et léger œdème et cordon veineux palpable	
5	Tous les signes de l'indice 4+ Purulence	

0 Cathéter fonctionnel, le laisser en place sauf si extravasation.

1 Cathéter fonctionnel, le surveiller très régulièrement. L'ôter si extravasation.

2-5 Retrait du cathéter.

SURVEILLANCE À CHAQUE PASSAGE DU POINT DE PONCTION, DE LA PERMÉABILITÉ ET DE LA RÉFECTION PANSEMENT

Pansement occlusif	Vérifier la bonne adhérence du pansement sur tous les contours
Réfection du pansement	En cas de non adhérence, réaliser sa réfection en respectant les mêmes conditions d'asepsie que pour la pose
Recherche de complications	Examiner le site d'insertion du cathéter à la recherche de complications : → <i>Infectieuses</i> : <i>rougeur, chaleur, douleur, fièvre</i> → <i>Mécaniques</i> : <i>Diffusion du produit Obstruction de la veine</i>
Réévaluer chaque jour la pertinence du maintien du CVP	→ <i>Retirer le cathéter dès l'apparition de complications</i> → <i>En cas d'arrêt du traitement Si maintien de celui-ci justifier la décision</i>

Assurer la traçabilité de la surveillance du point
de ponction et de la perméabilité de voie veineuse

